

預防 + RSV 守護初生寶寶及幼兒健康

什麼是呼吸道合胞病毒(RSV)？

RSV 是一種常見於嬰幼兒的呼吸道感染病毒。

- 在香港，RSV 感染全年皆可發生。
- RSV 可引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。這種病毒是引致一歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。患者會發燒，並出現其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體痛楚或虛弱無力，間中亦會引起中耳炎。RSV 亦可導致更嚴重的呼吸道疾病，甚至需要住院治療。
- RSV 沒有針對性的藥物治療，感染後只能使用紓緩症狀的藥物。

為你的寶寶預防RSV

預防措施是保持良好的個人及環境衛生。此外，美國疾病管制與預防中心建議透過**以下兩種免疫接種方案之一**來預防嬰兒患上嚴重的呼吸道合胞病毒感染及降低感染後住院的風險：

RSV 疫苗

孕婦接種疫苗後可將抗體及保護傳遞給您的寶寶。從接種到產生抗體，大約需時兩週，才能將保護傳遞給您的寶寶。

注射對象 妊娠32-36週孕婦

保護期 大約至出生後6個月

RSV 預防性抗體注射

預防性抗體注射不是疫苗，而是直接將保護性抗體注射到寶寶體內，幫助即時對抗RSV，注射後抗體立即發揮作用。

注射對象 新生嬰兒至一歲，
24個月以下有高風險
患上嚴重RSV的兒童

保護期 大約至注射後6個月

香港港安醫院—荃灣提供這兩種免疫接種服務。欲了解更多信息，請諮詢您的醫生。